

Legalon 140 – májregeneráló kapszula

A **Legalon 140** kapszula **toxikus májkárosodás**, kiválasztási problémák, valamint idült **gyulladásos májmegbetegedések** és májzsugorodás (májcirrhosis) kezelésére javallott. Hatóanyagai **erősen tisztítják és méregtelenítik a májat**. Használata nagyon javasolt a daganatellenes kúrák alatt, mert segítségével a kiválasztás sebessége és minősége mérhetően megnő.

A **Legalon 140** hatóanyagai a **máriatövis** (*Silybum marianum* Gaertn.) terméseiből kinyert **szilimarin** nevű flavolignánkeverék és a **szilibinin**. A szilimarin és a szilibinin felgyorsítja a protein szintézisét a májban, ami gyorsabb **sejtregenerálódást** eredményez. A szilimarin és a szilibinin a máj riboszómáiban fejti ki a hatását. A szilibinin a DNS-függő RNS polimeráz I. enzimhez kötődik, melynek következtében emelkedik a riboszomális RNS mennyisége, ez pedig a protein szintetizálódásának fokozódását eredményezi.



A szilibinin nemcsak a májat, hanem **a vesét is megvédi a toxikus károsodástól**, és vesekárosodás esetén a vesesejtek regenerálódását a májéhoz hasonlóan felgyorsítja. A szilimarin és a szilibinin **sejtregeneráló hatása** csak a nem rákos sejtekre vonatkozik, a rákos sejteknél ilyen jellegű stimuláló hatást nem tapasztaltak. A szilibinin feltehetően szelektíven hat a „normális” sejtek bizonyos típusaira, azok regenerálódását felgyorsítja, ugyanakkor gátolja a rosszindulatú sejtek növekedését. A szilibinin **megemeli a máj glutationszintjét**, melynek következtében változás történik az immunfunkciókban is, ami a jobb rák és vírus elleni védekezésben nyilvánul meg. A szilibinin **csökkenti a máj alkohol okozta károsodását**, és ugyancsak védelmet nyújt a fibrózis kialakulásával szemben. A májcsillagsejtek vagy zsírtároló sejtek a gyulladásos folyamatok hatására aktiválódnak, méretük jelentős mértékben megnő, és miofibroblasztokká alakulnak át. A szilibinin ezt az átalakulási folyamatot gátolja, így a szilibinin antifibrinogén hatással is rendelkezik. A szilibinin a fentiek mellett erősen gátolja a májkárosodást és epepangást eredményező gyulladások leukotriének képződését. A szilimarin és a szilibinin legerősebb májvédő hatása éppen a leukotriének képződésének gátlásán keresztül nyilvánul meg. A szilimarin és fő alkotórésze, a szilibinin védelmet nyújt a glutationszint lecsökkenésével szemben, gátolja a lipidperoxidációt, stabilizálja a sejtmembránokat, normalizálja a sejteket (antifibrinogén hatás), csökkenti a gyulladást és javítja a májfunkciót. Számos tanulmány eredménye támasztja alá azt, hogy **a szilimarin és a szilibinin a toxikus károsodásokkal szemben hatékony védelmet nyújt a májnak, a vesének és egyéb szerveknek.**

Adagolása:

Alapesetben : Naponta 3 X 1 szem

Súlyosabb esetben : Naponta 3 X 2 szem

Ha kérdése van hívja a 06 1 302 35 97 –es telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!

Rendelés és egyéb olvasható információ: a www.b17net.info weboldalon